



Abb. 3.3
Okzipito-
spenoidale
Palpation nach
Upledger.

3.4 Sphenookzipitale Palpation nach Magoun

Therapeut:

- Position am Kopfbende, schräg seitlich zum Patienten

Handposition:

- Daumen und Mittelfinger (oder Zeigefinger) der oberen Hand umgreifen von lateral die großen Keilbeinflügel
- untere Hand nimmt Hinterhaupt in die Handinnenfläche, die Finger zeigen nach lateral

SV der Inspirationsphase:

- Alae majores nach inferior und anterior
- kranialer Teil der Squama occipitalis nach inferior und posterior

SV der Expirationsphase:

- Alae majores nach superior und posterior
- Squama occipitalis nach superior und anterior

3.5 Frontookzipitale Palpation nach Sutherland (Abb. 3.4)

Therapeut:

- Position am Kopfende des Patienten

Handposition:

- obere Hand auf dem Stirnbein, Finger zeigen nach kaudal
- Mittelfinger auf der Sutura metopica oberhalb des Nasions
- übrige Finger lateral daneben
- untere Hand umgreift das Hinterhaupt mit der Handinnenfläche, Finger zeigen nach kaudal

Alternative Möglichkeit:

- Therapeut seitlich am Kopfende des Patienten
- obere Hand von der Seite her auf dem Stirnbein, Finger zeigen nach lateral
- untere Hand unter dem Hinterhaupt, Finger zeigen nach lateral

SV der Inspirationsphase:

- Augenbrauenbögen nach anterior-inferior
- seitliche Teile der Augenbrauenbögen nach außen (Außenrotation)
- kranialer Teil der Hinterhauptschuppe nach inferior-posterior

In der Expirationsphase:

- Augenbrauenbögen nach posterior-inferior
- laterale Teile der Augenbrauenbögen nach innen (Innenrotation)
- Squama des Hinterhaupts nach superior-anterior



Abb. 3.4
Frontookzipitale
Palpation nach
Sutherland.